

# 起こるかもしれない症状

- 注射した部位の腫れや痛み 当日に現れ2日くらい続く
- 筋肉痛、関節痛 多くは接種翌日に現れ、1日程度で治まる
- 頭痛 多くは接種翌日に現れ、1日程度で治まる
- 倦怠感、寒気、発熱 多くは接種翌日に現れ、1日程度で治まる



上記のような症状が出て数日してもよくなる場合は、医師の診察を受けてください。

## アナフィラキシー

発生頻度は低いが以下のような症状

- 皮膚のかゆみ、じんま疹、皮膚が赤くなる
- くしゃみ、のどのかゆみ、声のかすれ、息苦しさ
- 腹痛、吐き気
- 物が見えにくい
- 気分の不良



接種直後から15分以内にこのような症状が現れた場合は、直ちに接種した医師や看護師に伝えてください。

### ワクチン接種後の主な副反応

	1回目	2回目
接種した場所の痛み	67.7%	74.8%
倦怠感	28.6%	50.0%
頭痛	25.6%	41.9%
筋肉痛	17.2%	41.6%
寒気	7.0%	26.7%
発熱	7.4%	25.2%
接種した場所の腫れ	6.8%	26.7%
関節痛	7.1%	21.2%
吐き気	7.0%	13.9%

ワクチン接種後15分は、接種医療機関にお残りください。帰宅後、上記のようなアナフィラキシー症状が現れた場合は、速やかに検査が行える地域の基幹病院（市民病院、湘南鎌倉病院など）で診察を受けてください。

